



アンケート集計 2015

卒後経験(年)
回答数(240名)




所属施設の規模(床数)

回答数(240名)




CRPCの薬剤治療対象例数(年間)

回答数(240名)




所属施設


回答数(240名)




**Q1. 1ヵ月の前立腺癌薬物療法の
平均外来患者数は？（回答数237名）**




**Q2. そのうち、ドセタキセル施行前のCRPC
患者数(1ヵ月)は？ (回答数238名)**




Q3. ドセタキセル施行前のCRPC患者にアビラテロンを処方したことはありますか？（回答数240名）



Q4. ドセタキセル施行前のCRPC患者にエンザルタミドを処方したことはありますか？（回答数240名）




**Q5. ドセタキセル施行前のCRPC患者に対して、
通常アビラテロンとエンザルタミドのどちらを先に
使用しますか。（回答数211名）**



**Q6. ドセタキセル施行前のCRPC患者に対する
1stラインおよび2ndライン治療において
新規抗アンドロゲン剤(アビラテロン+エンザルタミド=100%
とした場合)の割合を教えてください。**


1stライン（回答数 216名）

アビラテロン:エンザルタミド




2stライン（回答数 201名）

アビラテロン:エンザルタミド




Q7. ドセタキセル施行前CRPC患者に対する1stライン治療で、エンザルタミドを多く使用されている方へ、エンザルタミドを先に使用する最大の理由をお教えてください


(回答は1つ)。(回答数198名)



Q8. ドセタキセル施行前CRPC患者に対する1stライン治療で、アビラテロンを多く使用されている方へ、アビラテロンを先に使用する最大の理由をお教えてください（回答は1つ）。（回答数102名）




Q9. ドセタキセル施行前のCRPC患者に対して、アビラテロンとエンザルタミドのどちらが使いやすいという印象をお持ちですか？（回答数220名）




Q10-1. Q9でエンザルタミドを選択した理由はなぜですか？

(回答数96名)




Q10-2. Q9でアビラテロンを選択した理由はなぜですか？

(回答数32名)




**Q10-3. Q9でどちらでも同じ程度を選択した
理由はなぜですか？**

(回答数45名)



Q10-4. Q9で薬剤別の選択理由？


(回答数248名)



Q11. ドセタキセル施行前のCRPC患者において、アビラテロンを1stラインとして使用した場合、治療成功期間(どれ位の期間投与可能か)はどれぐらいですか？また、開始容量(推奨用量:4錠1000mg/日)はどれぐらいですか？(印象で結構です)。(回答数 195名)


治療成功期間

(回答数195名)



開始用量


(回答数146名)



**Q12. ドセタキセル施行前のCRPC患者において、
エンザルタミドを1stラインとして使用した場合、
治療成功期間はどれぐらいですか？
また、開始容量（推奨用量：4カプセル160mg/日）は
どれぐらいですか？（印象で結構です）。**


治療成功期間

(回答数215名)




開始用量


(回答数157名)



Q13. アビラテロン・エンザルタミド使用後のドセタキセル不応CRPC患者に対して、1stライン治療としてどの薬剤を主に(最も多く)使用されますか？ 回答数(240名)



Q14. ドセタキセル施行後のCRPC患者に対して、アビラテロンとエンザルタミドのどちらが使いやすいという印象をお持ちですか？（回答数232名）




**Q15. ドセタキセル施行後のCRPC患者において、
アビラテロンを1stラインとして使用した場合、
治療成功期間はどれぐらいですか？**

**また、開始容量(推奨用量:4錠1000mg/日)はどれぐらい
ですか？(印象で結構です)。**


治療成功期間

(回答数213名)



開始用量

(回答数155名)




**Q16. ドセタキセル施行後のCRPC患者において、
エンザルタミドを1stラインとして使用した場合、
治療成功期間はどれぐらいですか？**

**また、開始容量（推奨用量：4カプセル160mg/日）は
どれぐらいですか？（印象で結構です）。**


治療成功期間

(回答数220名)



開始用量


(回答数162名)



Q17. ドセタキセル施行後のCRPC患者において、カバジタキセルを使用した場合、治療成功期間（サイクル数）と開始用量（推奨用量：25mg/m²）を教えてください（最も標準と思われる印象で結構です）。


治療成功期間

(回答数140名)




開始用量

(回答数150名)




ドセタキセル施行前後を通して質問します

Q18. アビラテロン投与にて対応に苦慮する 有害事象は何ですか？(複数回答OK)




Q19. エンザルタミド投与にて対応に苦慮する 有害事象は何ですか？（複数回答OK）




Q20. アビラテロンの最大の長所は何ですか？

(回答数: 133名)




Q21. アビラテロンの最大の短所は何ですか？

(回答数:179名)




Q22. エンザルタミドの最大の長所は何ですか？

(回答数:164名)




Q23. エンザルタミドの最大の短所は何ですか？

(回答数:172名)



Q24. カバジタキセルの最大の長所は何ですか？

(回答数: 101名)



Q25. カバジタキセルの最大の短所は何ですか？

(回答数: 129名)

