


アンケート集計 2016


卒後経験(年)

回答数(249名)




所属施設の規模(床数)

回答数(248名)




CRPCの薬剤治療対象例数(年間)

回答数(237名)




所属施設

回答数(249名)




Q1. 1ヵ月の前立腺癌薬物療法の 平均外来患者数は？（回答数248名）




Q2. そのうち、ドセタキセル施行前のCRPC


患者数(1ヵ月)は？ (回答数249名)




Q3. ドセタキセル施行前のCRPC患者にアビラテロンを処方したことはありますか？（回答数249名）



Q4. ドセタキセル施行前のCRPC患者にエンザルタミドを処方したことはありますか？（回答数249名）



**Q5. ドセタキセル施行前のCRPC患者に対して、
通常アビラテロンとエンザルタミドのどちらを先に
使用しますか。（回答数219名）**



Q6. ドセタキセル施行前のCRPC患者に対する


1stラインおよび2ndライン治療において

新規抗アンドロゲン剤(アビラテロン+エンザルタミド=100%

とした場合)の割合を教えてください。


1stライン（回答数 213名）

アビラテロン:エンザルタミド




2stライン（回答数 196名）


アビラテロン:エンザルタミド




Q7. ドセタキセル施行前CRPC患者に対する1stライン治療で、エンザルタミドを多く使用されている方へ、エンザルタミドを先に使用する最大の理由をお教えてください（回答は1つ）。（回答数179名）



Q8. ドセタキセル施行前CRPC患者に対する1stライン治療で、アビラテロンを多く使用されている方へ、アビラテロンを先に使用する最大の理由をお教えてください




**Q9. ドセタキセル施行前のCRPC患者に対して、
アビラテロンとエンザルタミドのどちらが使いやすいと
いう印象をお持ちですか？（回答数230名）**




Q10-1. Q9でエクスタンジを選択した理由はなぜですか？

(回答数86名)




Q10-2. Q9でアビラテロンを選択した理由はなぜですか？

(回答数38名)




**Q10-3. Q9でどちらでも同じ程度を選択した
理由はなぜですか？
(回答数33名)**



Q11. ドセタキセル施行前のCRPC患者において、アビラテロンを1stラインとして使用した場合、治療成功期間(どれ位の期間投与可能か)はどれぐらいですか？また、開始容量(推奨用量:4錠1000mg/日)はどれぐらいですか？(印象で結構です)。(回答数 195名)


治療成功期間

(回答数210名)



開始用量


(回答数210名)



**Q12. ドセタキセル施行前のCRPC患者において、
エンザルタミドを1stラインとして使用した場合、
治療成功期間はどれぐらいですか？
また、開始容量（推奨用量：4カプセル160mg/日）は
どれぐらいですか？（印象で結構です）。**


治療成功期間

(回答数220名)




開始用量


(回答数220名)



Q13. アビラテロン・エンザルタミド使用後のドセタキセル不応CRPC患者に対して、1stライン治療としてどの薬剤を主に(最も多く)使用されますか？ 回答数(239名)



**Q14. ドセタキセル施行後のCRPC患者に対して、
アビラテロンとエンザルタミドのどちらが使いやすい
という印象をお持ちですか？（回答数239名）**




**Q15. ドセタキセル施行後のCRPC患者において、
アビラテロンを1stラインとして使用した場合、
治療成功期間はどれぐらいですか？**

**また、開始容量（推奨用量：4錠1000mg/日）はどれぐらい
ですか？（印象で結構です）。**


治療成功期間

(回答数230名)



開始用量

(回答数213名)




**Q16. ドセタキセル施行後のCRPC患者において、
エンザルタミドを1stラインとして使用した場合、
治療成功期間はどれぐらいですか？**

**また、開始容量（推奨用量：4カプセル160mg/日）は
どれぐらいですか？（印象で結構です）。**


治療成功期間

(回答数234名)



開始用量


(回答数218名)



Q17. ドセタキセル施行後のCRPC患者において、カバジタキセルを使用した場合、治療成功期間（サイクル数）と開始用量（推奨用量：25mg/m²）を教えてください（最も標準と思われる印象で結構です）。


治療成功期間

(回答数212名)




開始用量

(回答数221名)




ドセタキセル施行前後を通して質問します

Q18. アビラテロン投与にて対応に苦慮する 有害事象は何ですか？（複数回答OK）




Q19. エンザルタミド投与にて対応に苦慮する 有害事象は何ですか？(複数回答OK)




Q20. アビラテロンの最大の長所は何ですか？

(回答数: 153名)




Q21. アビラテロンの最大の短所は何ですか？

(回答数: 169名)




Q22. エンザルタミドの最大の長所は何ですか？

(回答数: 163名)




Q23. エンザルタミドの最大の短所は何ですか？

(回答数:171名)




Q24. カバジタキセルの最大の長所は何ですか？

(回答数:140名)




Q25. カバジタキセルの最大の短所は何ですか？


(回答数: 168名)




**Q26. CRPCになる前にドセタキセルを導入すること
がありますか？ (回答数:241名)**



Q27. Yesの場合、どのような症例ですか？（複数 選択可）（回答数：67）



Q28. Noの場合、今後、保険適応になればCRPCになる前にドセタキセル導入を考慮したいとお考えですか？ (回答数:197名)



**Q29. 骨転移のあるCRPCに対してゾーフィゴ
(Rad-223)が保険収載されました。どのような症例
にゾーフィゴ投与を考慮したいとお考えですか？
(複数選択可) (回答数:463)**

| | |
|----------------------------|-----|
| 骨転移のあるCRPCで疼痛のある症例 | 106 |
| 疼痛の有無にかかわらず骨転移のあるCRPC症例 | 55 |
| ドセタキセル導入前 | 13 |
| ドセタキセル抵抗性となった後 | 25 |
| ドセタキセルは無関係 | 28 |
| エンザルタミドあるいはアビラテロン導入前 | 9 |
| エンザルタミドあるいはアビラテロンに抵抗性となった後 | 17 |
| エンザルタミドあるいはアビラテロンは無関係 | 23 |
| カバジタキセル導入前 | 14 |
| カバジタキセル抵抗性となった後 | 16 |
| カバジタキセルは無関係 | 22 |
| まだよくわからない | 56 |
| その他 | 8 |